

SEVILLA® 18.5 SC

PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE 18.5 SC

SEVILLA® 18.5 SC es un fungicida de amplio espectro con acción preventiva, curativa, traslaminar, local y sistémica con excelente acción antiesporulante compuesto por los ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole que son comúnmente usados para el control de la mancha del follaje (*Helminthosporium maydis*) del maíz (*Zea mays*). SEVILLA 18,5 SC está indicado para controlar enfermedades fúngicas producidas por Oomicetos (mildius), Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos en numerosos cultivos.

PERIODO DE REINGRESO: 4 HORAS

PERIODO DE CARENIA: 14 DÍAS

PRESENTACIONES COMERCIALES: 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L.

COLOMBIA

Cultivo	Plaga	Dosis
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	Mancha del follaje (<i>Helminthosporium maydis</i>)	0.75 L/ha (En volumen de mezcla de 200 L/ha)

CONTACTO ZELLAG

+34 96 186 21 20
info@zellag.com
Marines, Valencia (España)

+41 61 534 71 30
info@zellag.com
4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-SEVILLA 18.5 SC V.21.1**

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 2/3)

Cultivo	Enfermedad	Dosis
Tabaco (<u>Nicotiana tabacum</u>)	Mancha foliar (<u>Cercospora</u> spp.) Moho azul (<u>Pernospora tabacina</u>) Antracnosis (<u>Collectotrichum</u> spp.)	Inmersión de las plántulas: 1.5-2.0 ml/L agua
Plátano (<u>Musa</u> spp.)	Sigatoka amarilla (<u>Mycosphaerella musicola</u>) Sigatoka negra (<u>Mycosphaerella fijensis</u>) Bacteriosis (<u>Erwinia</u> sp, <u>Pseudomonas</u> sp)	Dosis preventiva: 0.75-1.0 L/ha (0.52-0.7 L/mz) Dosis curativa: 1.0-1.5 L/ha (0.7-1.0 L/mz)
Piña (<u>Ananas comosus</u>)	Fusariosis (<u>Fusarium</u> spp.)	
Coco (<u>Cocos nucifera</u>)	Pudrición del cogollo (<u>Phytophthora palmivora</u>)	
Arroz (<u>Oryza sativa</u>)	Tizón (<u>Pyricularia oryzae</u>) Mancha foliar (<u>Cercospora oryzae</u>) Pudrición (<u>Rhizoctonia</u> spp., <u>Phytophthora</u> spp., <u>Pythium</u> spp.) Fusariosis (<u>Fusarium</u> spp.)	Dosis preventiva: 0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz) Dosis curativa: 0.75-1.0 L/ha (0.52- 0.7 L/mz)
Café (<u>Coffea arabica</u>)	Roya (<u>Hemileia vastatrix</u>) Ojo de gallo (<u>Mycena citricolor</u>) Mancha de hierro (<u>Cercospora coffeicola</u>) Antracnosis (<u>Colletotrichum coffeanum</u>)	

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 3/3)

Cultivo	Enfermedad	Dosis
Melón (<u>Cucumis melo</u>) Pepino (<u>Cucumis sativus</u>) Sandía (<u>Citrullus lanatus</u>)	Mildiu polvoso (<u>Oidium</u> spp). Mildiu vellosa (<u>Peronospora parasitica</u>)	Dosis preventiva: 0.75-1.0 L/ha 1.25-1.5 ml/L de agua
Tomate (<u>Lycopersicum esculentum</u>). Papa (<u>Solanum tuberosum</u>)	Mancha bacterial (<u>Xanthomonas vesicatoria</u>) Tizón Temprano (<u>Alternaria solani</u>) Tizón Tardío (<u>Phytophthora infestans</u>) Mancha gris de la hoja (<u>Stemphylium solani</u>) Bacteriosis (<u>Erwinia</u> spp., <u>Xanthomonas</u> spp., <u>Pseudomonas</u> spp.)	Dosis curativa: 1.0-1.5 L/ha. 1.5-3.0 ml/L de agua Al trasplante: Inmersión de Plántulas: 1.5- 2.0 ml/L de agua Inmersión (semilla de papa) 1.5- 3.0 ml/L de agua
Chile dulce (<u>Capsicum annuum</u>)	Mancha bacterial (<u>Xanthomonas vesicatoria</u>) Ojo de pájaro (<u>Cercospora capsici</u>)	Al suelo: 1.5-3.0 ml/L de agua y m ²
Maní (<u>Arachis hypogaea</u>)	Viruela temprana (<u>Cercospora arachidicola</u>) Viruela tardía (<u>Cercospora personatum</u>) Podredumbre blanca (<u>Sclerotinia sclerotiorum</u>)	Dosis preventiva: 0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz) Dosis curativa: 0.75-1.0 L/ha (0.52- 0.7 L/mz)

CONTACTO ZELLAG

 +34 96 186 21 20
 info@zellag.com
 Marines, Valencia (España)

 +41 61 534 71 30
 info@zellag.com
 4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-CUPRITOEZELL 6.13 SC V.20.1**

www.zellag.com